

## BORDÓI POR®

### Környezetvédelmi előírások:

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát állóvizekbe, folyókba, vízfolyásokba vagy tározókba juttatni. A fenti vizek partjától mért biztonsági távolságot (50m) be kell tartani.

### Felhasználható: gombabetegségek ellen - szürkepenész és lisztharmat kivételével.

Kultúra	Betegség megnevezése	Dózis: %-os vagy 10l permetléhez szükséges adag dkg-ban	Megjegyzés
Szőlő (a szőlő levél ellenállóságát, felépítését fokozza)	Peronoszpóra, orbánc	1%-os 10 dkg	Virágzás előtt a fajták érzékenységét figyelembe kell venni, megelőző kezelés
Almatermésűek (a viaszosodott diónyi almát már ismét permetezhetjük vele)	Monília, varasodás	1%-os 10 dkg	Rügypattanástól a zöldbimbós állapotig
Őszibarack és csonthéjasok	Levélfodrosodás, ágelhalások	1%-os 10 dkg	Ősszel lombhulláskor, tavasszal rügypattanáskor
Szilva, ringló	Vörösfoltoosság	1%-os 10 dkg	A fehérbimbós stádiumig
Zöldségfélékben	Gombabetegségek (kivételem lisztharmat és szürkepenész)	0.5-1.0%-os 5-10 dkg	A tünetek megjelenésekor és szükség szerint 10-14 naponként ismételve
Burgonyában	Burgonyavész, alternária	0.8-1.0%-os 8-10 dkg	A virágzás előtt az előrejelzés alapján alkalmazható és szükség szerint 10-14 naponként javasolt megismételni

**A gyümölcsösökben az őszi lombhulláskori és a tavaszi rügypattanáskori permetezés nélkülözhetetlen!**

**A szer kijuttatásához szükséges permetlé mennyisége 100 m<sup>2</sup>-re:**

- szőlő, gyümölcsös: 7-10 liter
- zöldségfélékben: 5-10 liter
- burgonya: 5-7 liter

**Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.**

	<b>Kultúrnövény</b>	<b>várakozási idő (nap)</b>	<b>maradék (mg/kg)</b>
<b>Élelmezés- egészségügyi várakozási idő és megengedett hatóanyag maradék:</b>	Uborka, hüvelyes zöldség	5	10
	Paprika, paradicsom (hajtatott)	7	10
	Alma	10	10
	Konzervipari uborka	3	10
	Burgonya	7	10
	Egyéb kultúra	21	10