



Cantus®

Irtható kórokozók:

- Szürkepenész
- Lisztharmat
- Fehérpenész
- Alternária
- Plenodómuszos szárrák

Általános adatok

Hatóanyag	50% boscalid
Hatóanyagcsoport	Anilid
Forgalmazási kategória	III.
Engedély száma	47140/2004
Formuláció	Vízben oldható granulátum
Kiszerezés	0,05 kg, 1 kg
Eltarthatóság	3 év
Méregjelzés, veszélyjelek	N
Toxicitás	Méhekre nem jelölésköteles Vízi szervezetekre közepesen veszélyes p.o. LD ₅₀ értéke (patkányon): 2000 mg/kg
Tűzveszélyesség	Nem tűzveszélyes
Munka-egészségügyi várakozási idő	0 nap
Egyéb információ	–

Engedélyezett kultúrák

Kultúra	Károsító / felhasználás	Dózis	É.v.i.	Kijuttatási időszak / fejlettség
Őszi káposzta-repce	Becőrontó betegség (alternária), fehérpenészes rothadás (szklerotínia), fómás betegség	0,5 kg/ha	N. k.	Sárgabimbós állapottól a virágzás kezdetéig
Szőlő	Szürkepenészes rothadás (botritisz), lisztharmat	1,0–1,4 kg/ha	28 nap	Virágzáskor, fűrtzáródáskor és zsendüléskor



Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum	Szisztémikus és transzlamináris hatású. Rothadást okozó gombák, lisztharmatfélék, rozsdák és számos foltbetegség ellen hatékony.
Hatáskifejtés	A gombák mitokondriális elektrontranszportját gátolja (II-komplex, TCA-ciklus).
Kijuttatási idő	Preventíven, a fertőzési folyamat kezdetén.
A permetlé vízmennyisége	Szántóföldön 300-500 l/ha, szőlőben 600-1000 l/ha.
Permetléporlasztás	Finomcseppes kijuttatás.
Ideális hőmérséklet	Nem befolyásoló tényező.
Ideális időszak	Nem befolyásoló tényező.
Hatásnövelő körülmények	–
Kombinálhatóság	Szőlőben Cabrio Toppal, Vivandóval, Clarinettel, Polyram DF-fel, Delan 700 WG-vel, rézkészítményekkel, Acrobat MZ WG-vel vagy Forum R-rel kombinálható.
A felhasználás gyakorisága	Repcében évente egy, szőlőben legfeljebb évi három alkalommal.
Megjegyzés	–