

## Javasolt felhasználás



## Felhasználási javaslat

**Szölőben** a védekezést előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kezdjük el. A készítményt 10-14 napos permetezési fordulókkal, géptípustól és lombozattól függően 600-1600 l/ha permetlé felhasználásával (a 0,25%-os permetlé koncentráció mindenkor betartása mellett) végezzünk el. Gyenge fertőzési nyomásnál, és kisebb lombozat esetén az alacsonyabb dózis is elegendő védelmet biztosít.

## Termékjellemzők



**Összetétel** 25 g/l ciazofamid

**Formuláció** SC

**Dózis** 1,5-4 l/ha

**Felhasználható** Szőlőben, Tormában

**Károsító** Szőlőben - peronoszpóra ellen, Tormában - Fehér sömör ellen

**Kezelések száma** 3 alkalom évente

**Permetezései forduló** 10-14 nap

**É.V.I.** Szőlő - 21 nap, Torma - 14 nap

**Pufferzóna** 5 méter a felszíni vizektől



**Kiszerelés** 1 és 10 liter

**MILDICUT®**





Egy innovatív gombaölő szer

# Ciazofamid | Tartamhatás csapadékos körülmények között.



A ciazofamidnak köszönhetően a Mildicut csapadékos körülmények esetén is hosszú akár 12-14 napos védelmet biztosít.


# Nátrium-Foszfonát | Szsíztémikus hatás



A nátrium-foszfonátnak köszönhetően a Mildicut védi az új hajtásokat.

# MILDICUT®

Igazolt hatékonyság



Eger, 2013 Ráchege dülö, Kékfrankos

A két összetevőnek köszönhetően a Mildicut hatékonyan véd peronoszpóra ellen alacsony dózisban is.

# MILDICUT®

Innovatív & Egyedi

| Szsíztémikus hatás a két összetevőnek köszönhetően

Czf | ciazofamid

Na<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> | nátrium-foszfonát

→ Védi az új hajtásokat

| Védő és spóraölő hatás

| Kiváló esőállóság

| Zöldítő hatás

| Hosszú tartamhatás

| Hatásos a levélen, biztonságos a fürtön

